


Aspbacken inventering av kärlväxter

2025-08-25

Julia.Kniazeva@hotmail.com



Nejlíkrot




Liljekonvalj



Blåsippa



Hundäxing



Cypressfläta



Stenbär



Skogsnäva



Skogsklöver



Hallon



Örnbräken



Ärenpris




Stormåra



Fyrkantig johannesört



Fingerört



Gökärt


Nejlikrot

Blomningsperiod: juli - september



Liljekonvalj

Blomningsperiod: maj - juni



Blåsippa

Blomningsperiod: April - maj

Den är en av de allra första vårblommorna som tittar fram – ibland redan under **snösmältninge**



Hundäxing

Blomningsperiod: juni - juli



Cypressfläta

En vanlig bladmossa i Sverige som ofta växer på stenar, stubbar och trädstammar.

Cypressflätan har fått sitt namn från hur bladen ligger tätt och böjt längs stammen, vilket ger ett flätliknande utseende. Färgen varierar från ljusgrön till brungrön beroende på växtplats och ålder. Den är mycket anpassningsbar och förekommer i hela landet.



Stenbär

Stenbär är en lågväxande ört i hallonsläktet som trivs på torra, steniga platser i hela Norden. Den blommar med små vita blommor i juni och ger klarröda, syrliga bär i små klasar. Bären är ätliga men har stor kärna, vilket gör dem bäst i gelé eller saft – gärna tillsammans med blåbär eller hallon



Skogsnäva (Midsommarblomster)

Skogsnäva är en flerårig ört som blommar från **maj till juli** med vackra violetta, blå eller ibland vita blommor. Den trivs i glesa skogar, ängar och fjällmiljöer och är vanlig i hela Sverige. Blommorna har fem kronblad och sitter ofta två och två i knippen.



Skogsklöver

Skogsklöver är en flerårig ört i familjen ärtväxter som blommar från **juni till augusti** med mörkrosa blommor. Den liknar rödklöver men har smalare stipler och växer ofta i skogskanter, ängar och vägslänter. Stjälken är karakteristiskt knäböjd i leden, vilket ger den ett lite "zig-zag"-utseende.



Hallon

- Blomningsperiod: Maj–juni
- Skördetid: Juli–augusti (hösthallon kan ge bär ända till frosten)
- Bär: Röda, ibland gula eller svarta. Sammansatta av små stenfrukter
- Växtsätt: Buske med taggiga stammar som skjuter rotskott
- Pollinering: Blommorna är oansenliga men rika på nektar – älskas av bin och humlor



Örnbräken

Örnbräken är en av Sveriges största ormbunkar och förekommer i hela landet utom längst i norr. Den har stora, triangulära blad som växer enskilt från en underjordisk jordstam. Namnet kommer från att stjälkens snittyta ibland liknar en dubbelör



Fyrkantig johannesört

Blomningsperiod: juli – september.


Flerårig ört, 40–70 cm hög, med **gula blommor** och en stjälk som är nästan fyrkantig i genomskärning – därav namnet



Fingerört

Blomningsperiod: maj-september


Fingerört är ett stort växtsläkte i familjen rosväxter med över 500 arter, många av dem vanliga i Norden. De flesta har **femflikiga blad** och **öppna blommor** som liknar smultronblommor, ofta i nyanser av **gult, rött, rosa eller orange**. Vissa arter kryper längs marken, medan andra bildar tuvor eller små buskar



Gökärt

Blomningsperiod: maj-juni

En tidigblommande art som ofta syns i skogsbryn och på kalkrik mark



Ärenpris

Blomningsperiod: juni-augusti

Blommorna är små, blåvioletta och sitter i smala klasar som växer från bladvecken. De har fyra kronblad och är ofta lätt strimmiga, vilket ger dem ett skirt och vackert uttryck. Ärenpris är vanlig i torra skogsbryn och ängsmarker i Sverige.



Stormåra

Blomningsperiod: juni – augusti

Stormåra är en flerårig ört i måreväxtfamiljen som blommar med små, vita blommor. Den har en **fyrkantig stjälk**, kransställda smala blad (ofta 6–10 per krans), och växer gärna på **ängsmarker, vägkanter och betesmark**. Den kan bli upp till **1 meter hög** och är vanlig i stora delar av Sverige.

